11,694

RAPPORT

DE

L'INSPECTEUR MÉDICAL

POUR L'ANNÉE

1895

Présenté au Comité Sanitaire le 8 *Avril* 1896.

JERSEY:
LE LIEVRE, FRÈRES, IMPRIMEURS DES ÉTATS,
13, HALKETT PLACE.

RAPPORT

DE

L'INSPECTEUR MÉDICAL

POUR L'ANNÉE

1895

Présenté au Comité Sanitaire le 8 *Avril* 1896.

JERSEY :
LE LIEVRE, FRÈRES, IMPRIMEURS DES ETATS,
13, Halkett Place.

6/96/150 1896

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b29500114

Au Comité Sanitaire.

L'An 1896, le 8e jour d'Avril.

LE COMITÉ a reçu le Rapport de l'INSPECTEUR MÉDICAL pour l'année 1895 ; et il est ordonné que le dit Rapport sera imprimé, pour être distribué aux membres des Etats.

ERNEST LE SUEUR, *Grèffier.*

LONDON SCHOOL OF HYGIENE & TROPICAL MEDICINE
5
LIBRARY
-7 SEP 1943

Jersey, *le* 1*er Janvier*, 1896.

A MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU COMITÉ SANITAIRE.

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joints, 1° le tableau de la mortalité dans l'île de Jersey pendant l'année 1895 ; 2° le relevé de tous les cas de maladies épidémiques portés à notre connaissance pendant le cours de la même année.

L'examen détaillé de ces deux tableaux nous donne toute l'histoire des épidémies pendant l'année 1895.

Nous voyons tout dabord que 92 cas de maladies épidémiques nous ont été signalés, et d'autrepart que le nombre total des décès causés par ces mêmes maladies a été de 27. La répartition des cas suivant les diverses maladies se fait ainsi :

Nom des maladies.	Nombre des cas.	Nombre des décès.
Fièvre typhoïde	9	6
Variole	46	8
Scarlatine	9	0
Diphtérie	24	13
Augines diphtéritiques ...	4	0

Nous voyons que la diphtérie a causé de beaucoup le plus grand nombre de décès ; sur 24 cas il y a eu 13 morts, tandis que la variole ne cause que 8 morts sur 46 cas.

La répartition des épidémies dans l'île est fort inégale, comme on pouvait d'ailleurs s'y attendre ; la fièvre typhoïde est plutôt une maladie des villes et des grandes agglomérations de population, et la variole, la scarlatine pourront s'y propager aussi plus rapidement que dans les campagnes où la population est plus espacée. Nous voyons donc la fièvre typhoïde survenir dans la paroisse de St.-Hélier 5 fois sur 9, et la scarlatine 7 fois sur 9. La variole née dans l'intérieur de la ville ne donnera que 4 ou 5 cas dans les autres paroisses, et qui tous seront le résultat de l'importation directe par des malades venus de la ville.

La diphtérie seule a une marche toute différente et qui doit attirer l'attention. Sur 24 cas portés à notre connaissance, 6 seulement appartiennent à la paroisse de St.-Hélier et 15 sont survenus dans la paroisse de St.-Pierre. Nous avions déjà remarqué pendant les années précédentes que les paroisses de St.-Pierre, Ste.-Marie et St.-Ouen étaient particulièrement sujettes à cette maladie. La ville de St.-Hélier, qui a un si grand nombre d'écoles avec de grandes agglomérations d'enfants, ne présente que le quart des cas de diphtérie, tandis que les paroisses de l'ouest sont particulièrement frappées.

Si nous étudions maintenant le second tableau au point de vue de la désinfection et des efforts faits pour enrayer la propagation des maladies épidémiques, nous voyons que l'étuve à désinfection a été employée 36 fois et que 44 fois on a procédé à la fumigation avec acide sulfureux liquide, suivie de lavage des planchers et boiseries avec la solution de bichlorure de mercure.

Quatre fois on a dû détruire par le feu la totalité ou une partie des effets de literie.

Sur 92 cas d'épidémies portés à notre connaissance, 32 ont été isolés et désinfectés par les soins

du médecin traitant qui en gardait la responsabilité ; les 60 cas qui restent se répartissent ainsi qu'il suit au point de vue du mode de désinfection :

Maladies.	Etuve employée après tant de cas.	Fumigation après tant de cas.
Fièvre typhoïde	0	0
Variole	38	41
Scarlatine	0	2
Diphtérie	7	11
Augines	0	1

La désinfection a eu lieu dans les cas de variole aussitôt que le malade était transporté aux huttes, et c'est à cela certainement que nous avons dû d'enrayer la propagation de la maladie dans les paroisses où quelques cas avaient été importés (St.-Clément, Rozel). Pour les autres épidémies ou pour les cas de variole traités à domicile, la désinfection avait lieu aussitôt que le malade pouvait quitter la chambre et que le médecin traitant nous en donnait avis.

Si nous considérons maintenant la mortalité générale dans l'île de Jersey pendant l'année 1895, nous voyons que le nombre total des décès a été de 1,153, représentant une moyenne annuelle de 21·08 par mille habitants.

Il est probable que ce dernier chiffre pourra être de beaucoup réduit lorsqu'on aura diminué le nombre des maladies que l'on peut nommer évitables ; c'est-à-dire celles qui dépendent en grande partie de l'état sanitaire de l'île ; ce sont les huit maladies en tête du tableau de la mortalité, elles représentent à elles seule un total annuel de 116 décès, et leur importance dans la moyenne annuelle se fait bien remarquer dans certains mois comme Juin, Octobre et Novembre, où les maladies *évitables* étant au minimum, les moyennes mensuelles tombent à 12·1, 13·6 et 14.5.

Il me suffira de rappeler à votre Comité ce que j'ai déjà dit plusieurs fois au sujet de la diarrhée des enfants, qui a causé cette année, de Juillet à Septembre, environ 60 décès ; et de noter que sur les 8 décès par variole, au moins 5 n'avaient pas été vaccinés. (A notre connaissance, sur les 46 cas de variole dont notification fut faite au Greffier, 24 n'étaient pas vaccinés).

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mon très respectueux dévouement.

Dr. P. CHAPPUIS,

Inspecteur Médical.

TABLEAU DE LA MORTALITÉ DANS L'ILE DE JERSEY.—ANNÉE 1895.

Noms des Maladies.	Nombre des Décès par maladies et pour chaque mois.												Total annuel pour chaque maladie.
	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.	
Influenza	0	1	13	3	1	1	0	0	0	0	0	0	19
Fièvre typhoïde	0	1	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	6
Variole	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	0	8
Rougeole	7	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9
Scarlatine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coqueluche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diphtérie	0	1	2	0	2	0	0	0	1	3	2	2	13
Diarrhée	0	0	0	0	1	0	26	19	14	1	0	0	61
Tumeurs	7	4	10	3	3	2	6	3	5	4	3	3	53
Phtysie et Tuberculose	3	7	12	7	12	2	6	5	3	6	7	8	78
Bronchite	12	33	43	14	5	3	3	2	2	3	5	5	130
Pneumonie et congestion pulmonaire	3	21	21	14	8	3	0	3	2	2	2	4	83
Affections des voies respiratoires	3	1	2	3	1	1	4	1	0	2	1	0	19
Méningite	3	3	3	3	2	3	2	4	0	2	0	4	29
Congestion et autres affections cérébrales	19	18	19	8	8	6	7	5	13	7	1	5	116
Affections du cœur et appareil circulatoire	7	11	19	9	7	5	4	15	6	3	11	10	107
Affections du foie et appareil digestif	3	4	6	3	6	2	7	9	12	3	5	8	68
Paralysie et affections du système nerveux	5	6	6	3	4	5	3	5	4	6	4	2	53
Affections des reins	2	1	6	6	2	2	6	2	1	2	3	2	35
Anémie	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	4
Débilité	6	6	2	8	5	4	15	3	8	4	4	6	71
Vieillesse	9	13	18	12	4	9	11	6	4	5	9	6	106
Accidents et autres causes	8	7	5	8	6	6	5	12	9	7	6	6	85
Total des Décès par mois	97	138	191	105	77	56	107	94	89	62	66	71	
Moyenne par mille habitants	21·3	30·3	42·	23·1	16 9	12·1	23·5	20·6	19·5	13·6	14·5	15 6	

Nombre total des Décès pendant l'année, 1,153. Moyenne annuel pour 1,000 habitants, 21·08.

DANS L'ILE I

atives à la désinfection.

eux.—Lavage au bichlorure	e régnait dans sa famille ; elle omme d'Or, qui fut désinfectée.
eux. — Lavage au bichlorure	pluie contaminée.
vage au bichlorure.....	
vage au bichlorure.....	
vage au bichlorure.....	
vage au bichlorure.....	
	ent de l'égout.
ie de lavage	
.....	Traité à domicile.
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	ville chez Kermain, Aubergiste.
e.—Fumigation.—Lavage .	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	eures.
	iole le 28.

SCHOOL OF HYGIENE & TROPICAL MEDICINE
LIBRARY
7 SEP 1943